



Meer gras met meer eiwit.

Probeer&leer.

Verlaag uw kostprijs. Sluit de kringloop.
De juiste meststof : ammoniumstikstof.
Op het juiste moment: vroeg in 't voorjaar.
Vergeet de T-Som.



BEMESTINGSADVIES

Bron : www.bemestingsadvies.nl hoofdstuk 2.1.2-17 Versie 2020

Bemesting voor de 1e snede

Voor de eerste sneden geven meststoffen met een hoog aandeel ammonium (>75%) de hoogste N-benutting en opbrengst.

N-meststoffen kunnen worden gegeven als kalkammonsalpeter (50% ammonium), magnesiumammonsalpeter (50% ammonium), ammoniumsulfaat (100% ammonium), ammoniumsulfaatsalpeter (75% ammonium), ureum of ureum plus een ureaseremmer of als een blend van producten.

In het voorjaar is de kans op N-verliezen door uitspoeling of denitrificatie van nitraat het grootst.

Ammonium is weinig uitspoelingsgevoelig omdat het wordt vastgelegd in de grond. Bovendien wordt ammoniumstikstof in het vroege voorjaar slechts langzaam omgezet in nitraat door de lage bodemtemperaturen. De opbrengst maar ook het ruw eiwitgehalte van gras is dan ook hoger bij meststoffen met een hoog ammoniumaandeel in vergelijking tot kalkammonsalpeter. Voor een gelijke opbrengst kan worden volstaan met 80-90% van de N, die als KAS zou worden gegeven. De effecten van meststoffen met een hoog ammoniumaandeel zijn groter in een nat dan in een droog voorjaar.

*Gratis 2 ha bemest door loonwerker met NH₄-N**

Gratis analyse van het geproduceerde gras

Gratis bepaling van het nitraatresidu

Gratis bepaling van de pH

** alleen toedieningskosten*

Doe mee met 'Probeer&leer' van

BRABANT BEMEST BETER

Meld u aan bij: 0651596092 of blc@precisiebemester.nl

